

NIHI, Valdeane Simone Cenci. **Avaliação do hábito de sucção de chupeta e suas consequências oclusais e miofuncionais orais em pré-escolares.** 2011. 33p. Dissertação (Mestrado em Odontologia Integrada) Universidade Estadual de Maringá - UEM, Maringá - PR.

## RESUMO

A sucção de chupeta é um hábito não nutritivo muito comum entre as crianças. Seu uso de forma inadequada pode ser considerado um fator em potencial para o desenvolvimento da má oclusão e alterações bucais de ordem miofuncional. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre o hábito de sucção de chupeta e os efeitos nocivos à oclusão e alterações miofuncionais em função da frequência e duração do hábito. Foi um estudo transversal, realizado com 84 crianças de dois a cinco anos, de um Centro de Educação Infantil municipal, e seus pais/responsáveis. Os pais responderam um questionário a cerca do hábito e as crianças foram submetidas a avaliações clínicas. Para a análise estatística, utilizou-se a Regressão de Poisson e Regressão Logística Multinomial, sendo verificado que as crianças que possuem o hábito de sucção de chupeta apresentaram risco 11,33 vezes maior de apresentarem mordida aberta anterior, risco de 4,44 vezes de possuírem mordida cruzada posterior, 2,66 vezes de desenvolverem sobressaliência aumentada, 2,53 vezes de apresentarem relação canina alterada, risco de 2,33 vezes de apresentarem má oclusão, quando comparadas às crianças que nunca usaram chupeta. Sendo estes resultados todos estatisticamente significantes. Em relação às alterações miofuncionais orais, as crianças que chupavam chupeta, apresentaram risco de 1,29 vezes maior para apresentarem formato de palato duro inadequado, 1,27 vezes de terem deglutição alterada, risco de 1,17 vezes maior de apresentarem postura de lábios em repouso entreabertos, 1,15 vezes para postura de língua inadequada, em comparação com aquelas que nunca usaram. Na análise multivariada os valores de risco para mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, formato de palato duro inadequado e deglutição alterada, foram confirmados. Tanto a duração quanto a frequência do hábito de sucção de chupeta, influenciaram o aumento do risco para o desenvolvimento de mordida aberta anterior, mordida cruzada posterior, formato de palato duro inadequado e deglutição alterada.

Palavras-chaves: sucção, má oclusão, pré-escolares